

CONSENSO INFORMATO PER L'ESECUZIONE DI TAC CON MDC -SEZIONE RISERVATA AL MEDICO PRESCRITTORE-

Nell'invviare il/la paziente che deve effettuare TC con mdc, si dichiara di avere verificato e valutato i risultati delle indagini di laboratorio richieste al fine di fornire l'idoneità all'esecuzione della sopracitata indagine diagnostica:

- **Glicemia**
- **Creatinina**
- **Emocromo completo**
- **Elettroforesi proteica**
- **FT3, FT4, TSH**
- **ECG**

Note anamnestiche rilevanti:

- gravidanza in atto SÌ NO
- ipertensione
 - insufficienza renale grave
 - iperuricemia
 - diabete mellito
 - asma bronchiale
 - morbo di Waldenstrom
 - mieloma
 - mastocitosi
 - ALTRO _____

data ultima mestruazione (obbligatoria) _____

- allattamento al seno
- ipertiroidismo
- cardioaptia (IV classe NYHA)
- insufficienza epatica grave
- policitemia
- recente assunzione di farmaci nefrotossici
- recente (<5 gg) esame con mdc iodato ev
- anemia
- INTERVENTI CHIRURGICI SUBITI(_____)

Farmaci in uso

- betabloccanti
- interleukina 2
- FANS
- biguanidi

Allergie

- Farmaci
- Lattice
- ALTRO _____

PESO PAZIENTE: _____ kg

Preparazione alla procedura diagnostica e raccomandazioni

È necessario eseguire un digiuno completo a partire da 4-6 ore prima dell'esame.

Se si assumono terapie farmacologiche:

- i pazienti diabetici assumono Metformina (es. Metforai, Glucophage, Metfonorum,...) devono sospendere l'assunzione 48 ore prima dell'esame dopo aver consultato il medico curante o lo specialista che provvederà a sostituirlo con un altro prodotto antidiabetico. L'assunzione di Metformina potrà avvenire dopo almeno 48 ore dall'esame;
- i pazienti con insufficienza renale anche lieve, devono evitare l'assunzione, nelle 24 ore precedenti all'esame, di farmaci nefrotossici (FANS, antibiotici aminoglicosidi, beta-bloccanti);
- tutti gli altri farmaci devono essere assunti come abitudine.

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO PRESCRITTORE